

Vandstær *Cinclus cinclus*



Vandstæren er en spændende vintergæst på Fyn. Den er på størrelse med en buttet Stær, og er letgenkendelig med den store, hvide plet på strube og bryst i stærk kontrast til kroppens øvrige mørke farver. Vandstæren er ikke en stær, som navnet kunne antyde, men vandstærerne har deres helt egen familie, Vandstære Cinclidae med 5 arter.

Det første man ser, når man færdes langs et vandløb med Vandstær, kan være en lys plet lige over vandet ved åbredden – det er Vandstærens lyse bryst. Andre gange ser man Vandstæren stå på en sten, en gren eller lignende, mens den med mellemrum foretager nogle små hoppende, gyngende bevægelser med kroppen, eventuelt dykker den hovedet under vandet og bevæger hovedet fra side til side i søgen efter mulig føde. Pludselig dykker den, efter et kort øjeblik er den igen ved overfladen og vender ofte tilbage til den samme plads igen. Vandstæren er livlig og aktiv i perioder med fødeeftersøgning, som afbrydes med kortere eller længere pauser stillestående, let skjult for eksempel ved åbredden.


Vandstæren kan let iagttages på relativ tæt hold, blot man færdes roligt i området.




Vandstæren ankommer til Fyn i oktober og trækker igen bort i marts/april. I Dofbasen er – for Fyn - den tidligste registrering om efteråret i de seneste 25 år den 16.10.1993, mens den seneste registrering om foråret er 18.04.2006.

Vandstæren er, som navnet også antyder, tilknyttet vand. Den træffes både ved stærkt strømmende og ved mere stillestående vand, blot skal vandet være tilstrækkeligt rent til, at Vandstærens føde dyr kan leve der i passende mængde. Desuden bruger Vandstæren synet i sin jagt på føde dyrene under vandet, hvilket naturligvis også kræver vand af en vis klarhed. Når Vandstæren dykker trækkes en gennemsigtig hinde ned over øjet.

Vandstærens føde består hovedsageligt af vårfluelarver, men desuden indgår også andre insekter, orme, snegle med mere. Føden søges på bunden, medens fuglen under vandet bevæger sig hen over denne. Vandstæren udnytter vandets bevægelser hen over vinger og krop til at holde den presset ned mod bunden. Dykkene efter føde varer normalt kun meget kort tid, hvorefter Vandstæren dukker op til overfladen igen som en prop. Man kan herefter ofte opleve Vandstæren sidde og rengøre føden ved at baske den fra side til side ned mod vandet eller en hård overflade.



De Vandstære, vi ser på Fyn, kommer fortrinsvis fra det sydlige Norge og i mindre grad fra det sydlige Sverige, hvilket genfund af ringmærkede Vandstære viser (J. Bønlykke m.fl., 2006: Dansk trækfugleatlas).



Forekomst af Vandstær på Fyn de seneste 5 år (2013 – 2017) registreret i Dofbasen.

Vandstæren er en sjælden ynglefugl i Danmark med kun få sikre ynglefund i de bedste år. [Link til artikel i Pandion.dof.dk om ynglende dansk Vandstær](#)

Link til [Vandstærens sang](#), som vi kan høre den her hos os om vinteren (vinteroptagelse af en Vandstær i Holland fra xeno-canto.org).



Ethvert fund af Vandstæren bør registreres i Dofbasen, således vi får øget viden om Vandstærens forekomst på Fyn,

Du kan finde yderligere information om Vandstæren her:

- Link til artikel på Dofbasen om [Vandstær](#)
- Link til artikel på Fugleognatur.dk om [Vandstær](#)

Januar 2018

Tekst og foto[©]:Steen Lauritsen

